

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°

84

du 4 Août 1986

VIGNE

✱ C'est la pleine veraison pour de nombreux cépages >

*** Mildiou

On observe encore quelques repiquages, mais les fructifications sont moins abondantes. Un traitement au cuivre pourra être réalisé en fin de semaine afin de protéger les feuilles de l'installation d'un mildiou tardif.

*** Oïdium


Il n'est plus à craindre après la veraison

*** Cicadelles vertes = fortes populations

Elles pullulent dans de nombreuses régions. Ne traiter que si vous observez le seuil de une cicadelle par feuille - Utilisez des spécialités à base d'azinphos, formotion, methomyl, methidation, oxydemeton - methyl, parathion, phosalone, vamidothion, cypermethrine, deltamethrine, fenvalerate

/attention/

*** (azinphos, parathion et deltamethrine risquent de favoriser le développement des acariens).



ARBRES FRUITIERS

*** Tordeuse orientale et petite mineuse du pêcher

Renouvelez la protection sur les variétés tardives : Fayette, Michelini, Early O Henry, en respectant les délais d'emploi avant récolte.

*** Acariens des arbres fruitiers

Les premières pontes d'hiver des acariens rouges ont été observées la semaine dernière. En général les vergers de pêchers ne sont pas trop contaminés jusqu'à présent et supportent un seuil acceptable.

OLIVIERS

Les captures de mouche de l'olive sont en nette augmentation, S'il n'a pas déjà été réalisé, un traitement par appât insecticide est à effectuer d'urgence.



P 56

CULTURES MARAICHÈRES

*** Cladosporiose de la tomate et du melon

On observe des taches rondes jaunâtres à la face supérieure de la feuille et verdâtre à la face inférieure.
Plusieurs produits sont efficaces pour prévenir une infestation.

Chlorothalonil	FONGIL, DACONIL	tomate, melon
Mancozebe	N.S.	tomate, melon
Triforine	FUNGINEX	tomate
	DENARIN	
	SAPROL	
Carbendazime	CERECLAIR	tomate, melon
	PREFONGIL	
	BRAVOPLUS	

*** Mildiou de la tomate de plein champ

Assurez une protection grace aux produits suivants

Captafol	N.S.	
Chlorothalonil	FONGIL, DACONIL	
Cymoxanil en association	SYPHAL, CUPROFIX CZ ACTIVE, SYGAN, ANTEOR C, FULVAX REMILTINE, NOVOFIX FACTIVE	
Dichlofluanide	EUPARENE	
Mancozébe	N.S.	
Manébe	N.S.	
Propinebe	ANTRACOL	
Oxadixyl + mancozébe + cymoxanil	PULSAN	
Carbendazime + chlorothalonil	CERECLAIR, PREFONGIL, BRAVOPLUS	

FRAISIERS

La récolte des variétés pleine saison étant terminée et avant la remontée des variétés tardives, intervenir contre les acariens et l'oïdium avec :
Chinomethionate - MORESTAN

--> Coupez les stolons dès qu'ils apparaissent pour obtenir du rendement, sauf dans le cas de remplacement d'un plant mort.

MAIS

--> En CASINCA, le stade grain pateux est atteint, les traitements contre la pyrale ne sont plus possibles avec le matériel traditionnel.

--> Sur GHISONACCIA, ALERIA le stade 1 m 20 n'est pas toujours atteint. L'application de granulés insecticides ou de pyrethrinoïdes liquides efficaces et remanents est possible avec les appareils classiques.

-O-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-O